

化学療法レジメン

レジメン名 ペムブロリズマブ/DXR/GPA(AC)

上限:4クール

レジメンの概要 ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前薬物療法

診療科名 乳腺

投与量設定 キイトルーダ(ペムブロリズマブ) 200mg/body(day1),ドキシソピシン 60mg/m²(day1),エントキサン(シクロホスファミド) 600mg/m²(day1)

管理コード 150230

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間: 30分	フィルターライン使用	●	キイトルーダ注 生理食塩液PL「フソー」50mL	200mg/body 1瓶	○	4クール施行後 ペムブロリズマブ(150240)へ移行								
3	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○									
4	点滴静注	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg アロカス点滴静注235mg パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1.5瓶 1瓶 1袋	○									
5	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○									
6	点滴静注	時間: 10分	全開で	●	ドキシソピシン注 大塚生食注(100mL瓶)	60mg/m ² 1瓶	○	積算値チェック								
7	点滴静注	時間: 10分	全開で	●	エントキサン注 大塚生食注(100mL瓶)	600mg/m ² 1瓶	○									