

# 化学療法レジメン

レジメン名 オビヌツズマブ/ベンダムスチン(2-6クール目)

上限:5クール

レジメンの概要 CD20陽性の濾胞性リンパ腫

投与量設定 ガザイバ(オビヌツズマブ) 1000mg/body(day1),トリアキシン(ベンダムスチン) 90mg/m<sup>2</sup>(day1,2),

診療科名 血液

カロナル(アセトアミノフェン) 500mg(day1)p.o,ホ<sup>ラ</sup>ラミン(d-クロルフェニラミンマレイン酸塩) 2mg/day(day1)p.o

管理コード 200146

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2							
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カロナル,ホ <sup>ラ</sup> ラミン内服 (ガザイバ投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注	時間: 30分			パ <sup>ロ</sup> ノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋	○								
3	点滴静注	時間: 2時間20分	0-30分:25mL/h 30-60分:75mL/h 60分以降:150mL/h 全量250mLに調製 フィルターライン使用	●	ガザイバ注 生理食塩液(希釈用)	1000mg/body 1袋	○								
4	点滴静注	時間: 30分			生理食塩液PL「フ <sup>ソ</sup> ー」50mL	1瓶	○								
5	点滴静注	時間: 1時間	★ガザイバ投与完了より30分空ける★	●	トリアキシン注 大塚生食注(250mL袋)	90mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○	○							