

化学療法レジメン

レジメン名 オビヌツズマブ/ベンダムスチン(初回)

上限:1クール

レジメンの概要 CD20陽性の濾胞性リンパ腫

投与量設定 ガザイバ(オビヌツズマブ) 1000mg/body(day1,8,15),ベンダムスチン 90mg/m²(day1,2),

診療科名 血液

カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1,8,15)p.o,ホ^レラミン(ド^クロルフェニラミンマレイン酸塩) 2mg/day(day1,8,15)p.o

管理コード 200145

インターバル日数 28 (Day1から休業期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 8	Day 15					
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カロナール,ホ ^レ ラミン内服 (ガザイバ投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○	○					
2	点滴静注	時間: 30分	★ガザイバ投与60分前までに投与完了★		ソル ^ト ・ホ ^レ ロール静注用40mg 生理食塩液PL「フソー」50mL	2瓶 1瓶	○		○	○					
3	点滴静注	時間: 30分			大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
4	点滴静注	時間: 30分			ハ ^ロ ロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋	○								
5	点滴静注	時間: 1時間			大塚生食注(100mL瓶)	1瓶			○	○					
6	点滴静注	時間: 4時間15分 ※day1 時間: 3時間15分 ※day8,15	day1:12.5mL/hで開始 30分毎に12.5mL/hずつ増量可 ※最大100mL/hまで day8,15:25mL/hで開始 30分毎に25mL/hずつ増量可 ※最大100mL/hまで ★ソル ^ト ・ホ ^レ ロール投与完了より60分空ける★ 全量250mLに調製 フィルターライン使用	●	ガザイバ注 生理食塩液(希釈用)	1000mg/body 1袋	○		○	○					
7	点滴静注	時間: 30分			生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○								
8	点滴静注	時間: 10分	★ガザイバ投与完了より30分空ける★	●	ベンダムスチン注 生理食塩液PL「フソー」50mL	90mg/m ² 1瓶	○	○							