

化学療法レジメン

レジメン名 オビヌツズマブ/ベンダムスチン(初回)

上限:1クール

レジメンの概要 CD20陽性の濾胞性リンパ腫

投与量設定 ガザイバ(オビヌツズマブ) 1000mg/body(day1,8,15),トリアキシン(ベンダムスチン) 90mg/m²(day1,2),

診療科名 血液

カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1,8,15)p.o,ホ^レラミン(ド^クロルフェニラミンマレイン酸塩) 2mg/day(day1,8,15)p.o

管理コード 200145

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間 | 用法・その他 | 癌 | 薬品名称 | 用量/単位 | Day 1 | Day 2 | Day 8 | Day 15 | | | | | |
|----|---------|---|---|---|--|---------------------------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|
| 1 | 点滴静注 | 時間: _____ | ルートkeep用 フラッシュ用 ★カロナール,ホ ^レ ラミン内服 (ガザイバ投与30分前までに)★ フィルターライン使用 | | 大塚生食注(100mL瓶) | 1瓶 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 2 | 点滴静注 | 時間: 30分 | ★ガザイバ投与60分前までに投与完了★ | | ソル ^ト ロ ^ロ ール静注用40mg 生理食塩液PL「フソー」50mL | 2瓶 1瓶 | ○ | | ○ | ○ | | | | | |
| 3 | 点滴静注 | 時間: 30分 | | | 大塚生食注(100mL瓶) | 1瓶 | ○ | | | | | | | | |
| 4 | 点滴静注 | 時間: 30分 | | | ハ ^ロ セ ^ト ロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL | 1袋 | ○ | | | | | | | | |
| 5 | 点滴静注 | 時間: 1時間 | | | 大塚生食注(100mL瓶) | 1瓶 | | | ○ | ○ | | | | | |
| 6 | 点滴静注 | 時間: 4時間15分 ※day1 時間: 3時間15分 ※day8,15 | day1:12.5mL/hで開始 30分毎に12.5mL/hずつ増量可 ※最大100mL/hまで day8,15:25mL/hで開始 30分毎に25mL/hずつ増量可 ※最大100mL/hまで ★ソ ^ル ト ^ロ ール投与完了より60分空ける★ 全量250mLに調製 フィルターライン使用 | ● | ガザイバ注 生理食塩液(希釈用) | 1000mg/body 1袋 | ○ | | ○ | ○ | | | | | |
| 7 | 点滴静注 | 時間: 30分 | | | 生理食塩液PL「フソー」50mL | 1瓶 | ○ | | | | | | | | |
| 8 | 点滴静注 | 時間: 1時間 | ★ガザイバ投与完了より30分空ける★ | ● | トリアキシン注 大塚生食注(250mL袋) | 90mg/m ² 1瓶 | ○ | ○ | | | | | | | |