

化学療法レジメン

レジメン名 オビヌツズマブ/CHOP(2-6クール目)

上限:5クール

レジメンの概要 CD20陽性の濾胞性リンパ腫

投与量設定 ガザイバ(オビヌツズマブ) 1000mg/body(day1),オンコピン(ピンクリスチン) 1.4mg/m<sup>2</sup>(day2),ドキシルピシン 50mg/m<sup>2</sup>(day2),エンドキサン(シクロホスファミド) 750mg/m<sup>2</sup>(day2),

診療科名 血液

プレートニン 100mg/body(day2-6)p.o,カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1)p.o,ホ<sup>ラ</sup>ラミン(d-クロルフェニラミンマレイン酸塩) 2mg/day(day1)p.o

管理コード 200141

インターバル日数 21 (Day1から休業期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2								
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カロナール,ホ <sup>ラ</sup> ラミン内服 (ガザイバ投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○								
2	点滴静注	時間: 2時間20分	0-30分:25mL/h 30-60分:75mL/h 60分以降:150mL/h 全量250mLに調製 フィルターライン使用	●	ガザイバ注 生理食塩液(希釈用)	1000mg/body 1袋	○									
3	点滴静注	時間: 30分			パ <sup>ロ</sup> セトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋		○								
4	点滴静注	時間: 30分	※最大1回2mg/body	●	オンコピン注 生理食塩液PL「フ <sup>ソ</sup> 」 50mL	1.4mg/m <sup>2</sup> 1瓶		○								
5	点滴静注	時間: 30分	<b>積算値チェック</b>	●	ドキシルピシン注 大塚生食注(100mL瓶)	50mg/m <sup>2</sup> 1瓶		○								
6	点滴静注	時間: 2時間		●	エンドキサン注 大塚生食注(250mL袋)	750mg/m <sup>2</sup> 1袋		○								