

化学療法レジメン

レジメン名 オビヌツズマブ/CHOP(初回)

上限:1クール

レジメンの概要 CD20陽性の濾胞性リンパ腫

投与量設定 ガザイバ(オビヌツズマブ) 1000mg/body(day1,8,15),オンコピン(ビンクリスチン) 1.4mg/m<sup>2</sup>(day2),ドキソルビシン 50mg/m<sup>2</sup>(day2),エンドキサン(シクロホスファミド) 750mg/m<sup>2</sup>(day2),

診療科名 血液

フレトニン 100mg/body(day2-6)p.o.カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1,8,15)p.o.ホララミン(d-クロルフェニラミンマレイン酸塩) 2mg/day(day1,8,15)p.o

管理コード 200140

インターバル日数 21 (Day1から休業期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 8	Day 15					
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カロナール,ホララミン内服 (ガザイバ投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○	○					
2	点滴静注	時間: 30分	★ガザイバ投与60分前までに投与完了★		ソル・オ <sup>®</sup> ロール静注用40mg 生理食塩液PL「フソー」50mL	2瓶 1瓶	○		○	○					
3	点滴静注	時間: 1時間			大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○	○					
4	点滴静注	時間: 4時間15分 ※day1 時間: 3時間15分 ※day8,15	day1:12.5mL/hで開始 30分毎に12.5mL/hずつ増量可 ※最大100mL/hまで day8,15:25mL/hで開始 30分毎に25mL/hずつ増量可 ※最大100mL/hまで ★ソル・オ <sup>®</sup> ロール投与完了より60分空ける★ 全量250mLに調製 フィルターライン使用	●	ガザイバ注 生理食塩液(希釈用)	1000mg/body 1袋	○		○	○					
5	点滴静注	時間: 30分			パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋		○							
6	点滴静注	時間: 30分	※最大1回2mg/body	●	オンコピン注 生理食塩液PL「フソー」50mL	1.4mg/m <sup>2</sup> 1瓶		○							
7	点滴静注	時間: 30分	<b>積算値チェック</b>	●	ドキソルビシン注 大塚生食注(100mL瓶)	50mg/m <sup>2</sup> 1瓶		○							
8	点滴静注	時間: 2時間		●	エンドキサン注 大塚生食注(250mL袋)	750mg/m <sup>2</sup> 1袋		○							