

化学療法レジメン

レジメン名 アカラブルチニブ/オビヌツズマブ(2クール目)

上限: 1クール

レジメンの概要 CD20陽性の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)

投与量設定 ガザイバ(オビヌツズマブ) 100mg/body(day1),900mg/body(day2),1000mg/body(day8,15),カルケンス(アカラブルチニブ) 200mg/day 1日2回(day1-28)p.o.

診療科名 血液

カロナル(アセトアミノフェン) 500mg(day1,2,8,15)p.o.ホラミン(d-クロルフェニラミンマレイン酸塩) 2mg/day(day1,2,8,15)p.o

管理コード 200160

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 8	Day 15					
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カルケンス内服 (ガザイバ投与60分前までに)★ ★カロナル,ホラミン内服 (ガザイバ投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○	○	1クール目:カルケンス(アカラブルチニブ)のみ (28日間連日投与) 2クール目よりレジメン適応可能				
2	点滴静注	時間: <u>30分</u>	★ガザイバ投与60分前までに投与完了★		ソル・ドロール静注用40mg 生理食塩液PL「フソー」50mL	2瓶 1瓶	○	○	○	○					
3	点滴静注	時間: <u>1時間</u>			大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○	○					
4	点滴静注	時間: <u>4時間</u>	★ソル・ドロール投与完了より60分空ける★ 25mL/hで投与 全量100mLに調製 フィルターライン使用	●	ガザイバ注 生理食塩液(希釈用)	100mg/body 1袋	○								
5	点滴静注	時間: <u>4時間</u>	★ソル・ドロール投与完了より60分空ける★ 13.9mL/hで開始 30分毎に13.9mL/hずつ増量可 ※最大111.1mL/hまで 全量250mLに調製 フィルターライン使用	●	ガザイバ注 生理食塩液(希釈用)	900mg/body 1袋		○							
6	点滴静注	時間: <u>3時間15分</u>	★ソル・ドロール投与完了より60分空ける★ 25mL/hで開始 30分毎に25mL/hずつ増量可 ※最大100mL/hまで 全量250mLに調製 フィルターライン使用	●	ガザイバ注 生理食塩液(希釈用)	1000mg/body 1袋			○	○					