

化学療法レジメン

レジメン名 ペルツズマブ(初回1200mg/body)/トラスツズマブ/PTX

レジメンの概要 HER2陽性の乳癌

診療科名 乳腺

投与量設定 フェスコIN(ペルツズマブ 1200mg/body,トラスツズマブ 600mg/body)(day1),パクリタキセル 80mg/m²(day1,8,15)

管理コード 150066

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間 | 用法・その他 | 癌 | 薬品名称 | 用量/単位 | Day 1 | Day 8 | Day 15 | | | | | | |
|----|---------|----------------|---|---|---|---------------------------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 点滴静注 | 時間: _____ | ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 | | 大塚生食注(100mL瓶) | 1瓶 | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 2 | 皮下注射 | 時間: _____ | 大腿部に皮下投与 <small>前回の注射部位から2.5cm以上離すこと 本剤15mLを8分以上かけて投与 投与終了後30分の経過観察を行う</small> | ● | フェスコ注IN | 1瓶 | ○ | | | | | | | | |
| 3 | 点滴静注 | 時間: <u>15分</u> | | | デキサート注射液6.6mg ファモチジン注射用20mg ホパラミン注5mg 生理食塩液PL「フソー」50mL | 1瓶 1管 2管 1瓶 | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 4 | 点滴静注 | 時間: <u>1時間</u> | フィルターライン使用 | ● | パクリタキセル注 大塚生食注(250mL袋) | 80mg/m ² 1袋 | ○ | ○ | ○ | | | | | | |