

化学療法レジメン

レジメン名 ペルツズマブ(2クール目以降600mg/body)/トラスツズマブ/DTX

レジメンの概要 乳癌

診療科名 乳腺

投与量設定 フェスコ[®]MA(ペルツズマブ 600mg/body,トラスツズマブ 600mg/body)(day1),トセタキセル 75mg/m²(day1)

管理コード 150072

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	皮下注射	時間: _____	大腿部に皮下投与 <small>前回の注射部位から2.5cm以上離すこと 本剤10mLを5分以上かけて投与 投与終了後15分の経過観察を行う</small>	●	フェスコ [®] 注MA	1瓶	○								
3	点滴静注	時間: <u>15分</u>			デキサート注射液6.6mg 生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶 1瓶	○								
4	点滴静注	時間: <u>1時間</u>		●	トセタキセル注 大塚生食注(250mL袋)	75mg/m ² 1袋	○								