

化学療法レジメン

レジメン名 ペムプロリズマブ/SOX

レジメンの概要 治療切除不能な進行・再発の胃癌（HER2陰性）

診療科名 消化器

投与量設定

キイトルダ[®](ハムゾマズマブ) 200mg/body(day1),オキサリプラチン 130mg/m²(day1),エソメタジド[®](ネカフル・キマシル・チラシド)C法 80-120mg/day1日2回(day1-14) p.o

管理コード 100213

インターバル日数

21（Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間：30分	フィルターライン使用	●	キイトルダ [®] 注 生理食塩液PL「フソ」50mL	200mg/body 1瓶	○								
3	点滴静注	時間：10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソ」50mL	1瓶	○								
4	点滴静注	時間：15分			デキサト [®] 注射液6.6mg ガラセト [®] 点滴静注バッグ 1mg/50mL	1瓶 1袋	○								
5	点滴静注	時間：2時間	全量500mLに調製	●	オキサリプラチン注 ブドウ糖液5%（希釈用）	130mg/m ² 1袋	○								