

化学療法レジメン

レジメン名 ペムプロリズマブ/CapeOX

レジメンの概要 治癒切除不能な進行・再発の胃癌（HER2陰性）

診療科名 消化器

投与量設定 キイトルダ(ペムプロリズマブ) 200mg/body(day1), 林サリアチン 130mg/m²(day1), セロニダ(カペシチン) C法2400-4200mg/day1日2回(day1-14)p.o

管理コード 100212

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間 : 30分	フィルターライン使用	●	キイトルダ注 生理食塩液PL「フー」 50mL	200mg/body 1瓶	○								
3	点滴静注	時間 : 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○								
4	点滴静注	時間 : 15分			デキサト注射液6.6mg ガラセトの点滴静注バッグ 1mg/50mL	1瓶 1袋	○								
5	点滴静注	時間 : 2時間	全量500mLに調製	●	林サリアチン注 ブドウ糖液5% (希釈用)	130mg/m ² 1袋	○								