

化学療法レジメン

レジメン名 ダウノルビシン/シタラビン【リポソーム製剤】(寛解導入:1クール目)

上限：1クール

レジメンの概要 高リスク急性骨髄性白血病

診療科名 血液

投与量設定 ピキセオス(ダウノルビシン・シタラビン リポソーム製剤) 100ユニット(ダウノルビシン/シタラビンとして44mg/100mg)/m²(Day1、3、5)、

管理コード 200180

インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) 投与開始4-6時間前 ラスプリカーゼ3.0-6.0mg/body(TLS予防)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 3	Day 5						
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間：30分			アカリ点静注235mg パロセトロン点静注バッグ0.75mg 50mL	1瓶 1袋	○								
3	点滴静注	時間：10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「77-」 50mL	1瓶	○								
4	点滴静注	時間：1時間30分	フィルター不可 注射用水の欄:total量を記載 1瓶を注射用水19mLで溶解 溶解後総量20mL	●	ピキセオス配合静注用 注射用水(100mL) 大塚生食注(500mL袋)	44mg/m ² 1瓶 1袋	○	○	○	積算値チェック					

ダウノルビシンとして

地方独立行政法人 新小山市市民病院