

化学療法レジメン

レジメン名 ギルバツキシマブ/CapeOX(2クール目以降600mg/m²)

レジメンの概要 CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌

診療科名 消化器

投与量設定 ギロイ(ギルバツキシマブ) 600mg/m², 林ガリアチン 130mg/m²(day1), ガクシタチン C法2400-4200mg/day1日2回(day1-14)p.o

管理コード 100033

インターバル日数 21 (Day1から休業期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間: 30分			デキスト注射液6.6mg アガリス点滴静注235mg ホウラン注5mg パロヒトロン点滴静注パック0.75mg 50mL	1.5瓶 1瓶 2管 1袋	○									
3	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「77-」 50mL	1瓶	○									
4	点滴静注	時間: _____	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:20mg/mL 必要量を抜き取り希釈 2.0mg/mLに希釈調製して使用 0-30分:50mL/h 30-60分:100mL/h 60分以降:200mL/h	●	ギロイ注 注射用水(100mL) 生理食塩液(希釈用)	600mg/m ² 1瓶 mL	○									
5	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「77-」 50mL	1瓶	○									
6	点滴静注	時間: 2時間	全量500mLに調製	●	林ガリアチン注 ブドウ糖液5%(希釈用)	130mg/m ² 1袋	○									