

# 化学療法レジメン

レジメン名 ゾルベツキシマブ/CapeOX(初回800mg/m<sup>2</sup>)

レジメンの概要 CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌

投与量設定 ビ`ロイ(ゾルベツキシマブ) 800mg/m<sup>2</sup>, 林ガリアチン 130mg/m<sup>2</sup>(day1), カ`シタ`ン C法2400-4200mg/day1日2回(day1-14)p.o

診療科名 消化器

ジブ`レチ(ラジガ`ピ`ン) 5mg/day1日1回夕食後(day0-5)p.o

管理コード 100032

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間: <u>30分</u>			テ`キート注射液6.6mg ア`カリス点滴静注235mg ホ`ラミン注5mg バ`ロ`ヒト`ン点滴静注バ`グ` 0.75mg 50mL	1.5瓶 1瓶 2管 1袋	○									
3	点滴静注	時間: <u>10分</u>	フラッシュ用		生理食塩液PL「フ`」 50mL	1瓶	○									
4	点滴静注	時間: _____	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:20mg/mL 必要量を抜き取り希釈 2.0mg/mLに希釈調製して使用 0-30分:75mL/h 30-60分:150mL/h 60分以降:200mL/h	●	ビ`ロイ注 注射用水(100mL) 生理食塩液(希釈用)	800mg/m <sup>2</sup> 1瓶 mL	○									
5	点滴静注	時間: <u>10分</u>	フラッシュ用		生理食塩液PL「フ`」 50mL	1瓶	○									
6	点滴静注	時間: <u>2時間</u>	全量500mLに調製	●	林ガリアチン注 ブ`ト`ウ糖液5%(希釈用)	130mg/m <sup>2</sup> 1袋	○									