

化学療法レジメン

レジメン名【消】トラスツズマブ デルクステカン

レジメンの概要がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌

診療科名消化器

投与量設定インハーツ(トラスツズマブ デルクステカン) 6.4mg/kg(day1)

管理コード100150

インターバル日数21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		ブドウ糖液5%(100mL)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間 : 30分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○									
					アムリリス点滴静注235m g	1瓶										
					パロメトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋										
3	点滴静注	時間 : 10分	フラッシュ用		ブドウ糖液5%(100mL)	1瓶	○									
4	点滴静注	時間 : 30分	1Vにつき注射用水5mLで溶解 必要量を抜き取り希釈 注射用水の欄:total量を記載 ※初回は1時間30分 点滴バッグを遮光 フィルターライン使用	●	インハーツ注	6.4mg/kg	○									
					注射用水(100mL)	1瓶										
					ブドウ糖液5%(100mL)	1瓶										