

化学療法レジメン

レジメン名 【消】パニツムマブ+FOLFIRI

レジメンの概要 結腸、直腸癌

診療科名 消化器

投与量設定  $\text{パニツムマブ}$  (パニツムマブ) 6mg/kg(day1)、 $\text{レボレチン}$  200mg/m<sup>2</sup>(day1)、 $\text{イリリカ}$  150mg/m<sup>2</sup>(day1)、 $\text{フルオラシ}$  400mg/m<sup>2</sup>(bolus)(day1)、2400mg/m<sup>2</sup>(46hr)(day1-2)

管理コード 100018

インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路      | 点滴時間      | 用法・その他                           | 癌 | 薬品名称                                  | 用量/単位                 | Day 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------|-----------|----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | CVポート<br>メイン | 時間： _____ | ルートkeep用<br>フラッシュ用<br>フィルターライン使用 |   | 大塚生食注(100mL瓶)                         | 1瓶                    | ○     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | CVポート<br>メイン | 時間： 1時間   | 全量100mLに調製<br>フィルターライン使用         | ● | $\text{パニツムマブ}$ 注                     | 6mg/kg                | ○     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |           |                                  |   | 生理食塩液（希釈用）                            | 1瓶                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | CVポート<br>メイン | 時間： 15分   |                                  |   | $\text{デキサメタゾン}$ 注射液6.6mg             | 1瓶                    | ○     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |           |                                  |   | $\text{パニツムマブ}$ 点滴静注パニツムマブ0.75mg 50mL | 1袋                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | CVポート<br>側管  | 時間： 2時間   | イリリカと同時投与                        |   | $\text{レボレチン}$ 注                      | 200mg/m <sup>2</sup>  | ○     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |           |                                  |   | 大塚糖液5%(250mLソフトパック)                   | 1袋                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | CVポート<br>メイン | 時間： 2時間   | $\text{レボレチン}$ と同時投与             | ● | イリリカ注                                 | 150mg/m <sup>2</sup>  | ○     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |           |                                  |   | 大塚糖液5%(250mLソフトパック)                   | 1袋                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | CVポート<br>メイン | 時間： 10分   | 全開で                              | ● | $\text{フルオラシ}$ 注                      | 400mg/m <sup>2</sup>  | ○     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |           |                                  |   | 生理食塩液PL「フソ」 50mL                      | 1瓶                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | CVポート<br>メイン | 時間： 46時間  | 携帯型ディスポ注入器<br>全量100mLに調製         | ● | $\text{フルオラシ}$ 注                      | 2400mg/m <sup>2</sup> | ○     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |           |                                  |   | 生理食塩液（希釈用）                            | 1瓶                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |