

化学療法レジメン

レジメン名 【血】DA-EPOCH(Level4)

上限：8クール

レジメンの概要 悪性リンパ腫

投与量設定
 イト°シト 86.4mg/m²(day1-4), ヲコヒン(ヒンクリスチン) 0.4mg/m²(day1-4), ト°キルビ°シン 17.3mg/m²(day1-4),
 イント°キサン(シカヒスファミド°) 1296mg/m²(day5), プ°レト°コ° 60mg/m²/回 1日2回(day1-5)p.o

診療科名 血液

管理コード 200105

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6			
1	点滴静注 末梢メイン	時間 : 24時間	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(1000mLリフトバ°ック)	1袋	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00				
2	点滴静注 末梢側管	時間 : 30分	側管上部		グラセト°点滴静注バ°ック 1mg/50mL ア°カリス点滴静注235m g	1袋 1瓶	○ 9:00								
3	点滴静注 末梢側管	時間 : 30分	側管上部		グラセト°点滴静注バ°ック 1mg/50mL	1袋		○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00					
4	点滴静注 末梢側管	時間 : 30分	側管上部		バ°ロ°セト°点滴静注バ°ック 0.75mg 50mL	1袋					○ 9:00				
5	点滴静注 末梢側管	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 側管下部		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○	○	○	○	○				
6	点滴静注 末梢側管	時間 : 24時間	側管下部 ※イト°ポシト用量200mgを超える 場合は50倍希釈する	● ヲコヒン注 ● ト°キルビ°シン注 ● イト°シト°注	大塚生食注(500mLリフトバ°ック)	0.4mg/m ² 17.3mg/m ² 86.4mg/m ² 1袋	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00	積算値チェック				
7	点滴静注 末梢側管	時間 : 3時間	側管下部	● イント°キサン注	大塚生食注(250mL袋)	1296mg/m ² 1瓶					○ 10:00				
8	点滴静注 末梢側管	時間 : 30分	側管上部		グラセト°点滴静注バ°ック 1mg/50mL	1袋	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00					
9	皮下注射	時間 : _____	エンドキサン注終了後 24時間以上経過してから投与		ジ°ラスタ皮下注	1筒						○			