

化学療法レジメン

レジメン名 【血】GDC

上限：6クール

レジメンの概要 再発・難治性悪性リンパ腫

投与量設定(点滴) ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8)、加味プロラチン AUC=3~5,投与量=AUC×(25+GFR)(day1)

診療科名 血液 投与量設定(内服) デカトロン(デキサメタゾン) 40mg/body(day1-4)

管理コード 200050 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 4	...	Day 8				
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○				○				
2	点滴静注	時間：30分			パロチド点注静注パグ 0.75mg 50mL	1袋	○								
					アカリ点注静注235m g	1瓶									
3	点滴静注	時間：30分			グラセド点注静注パグ 1mg/50mL	1袋					○				
4	点滴静注	時間：10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○								
5	点滴静注	時間：30分		●	ゲムシタビン注	1000mg/m ²	○				○				
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
6	点滴静注	時間：1時間		●	加味プロラチン注	AUC=3~5	○								
					大塚糖液5%(250mLソフトパグ)	1袋									
	内服	時間：_____			デカトロン	40mg/body	○	...	○						