

化学療法レジメン

レジメン名 【血】オビヌズマブ+CHOP(1クール目)

上限：1クール

レジメンの概要 CD20陽性の濾胞性リンパ腫

投与量設定(点滴) ガザイバ(オビヌズマブ) 1000mg/body(day1,8,15)、ワレベン(ベンチクリン) 1.4mg/m²(day2)、
ドキシゲシ 50mg/m²(day2)、インドキサシ(シクロホスファミド) 750mg/m²(day2)

診療科名 血液 投与量設定(内服) プレドニ(プレドニゾロン) 100mg/day(day2-6)、加ナール(メトキシケルゲリン) 500mg/day(day1,8,15)、ホラミン(d-グルタミン酸塩) 2mg/day(day1,8,15)

管理コード 200140 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	...	Day 6	...	Day 8	...	Day 15	
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★加ナール、ホラミン内服 (ガザイバ投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○				○		○	
2	点滴静注	時間：30分	★ガザイバ投与60分前までに投与完了★		リル・マトール静注用40mg 生理食塩液PL「フー」 50mL	2瓶 1瓶	○					○		○	
3	点滴静注	時間：1時間			大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○					○		○	
4	点滴静注	時間：4時間20分 ※day1 時間：3時間15分 ※day8,15	day1:12mL/hで開始 30分毎に12mL/hずつ増量可 ※最大100mL/hまで day8,15:25mL/hで開始 30分毎に25mL/hずつ増量可 ※最大100mL/hまで ★リル・マトール投与完了より60分空ける★ 全量250mLに調製 フィルターライン使用	●	ガザイバ注 生理食塩液（希釈用）	1000mg/body 1袋	○					○		○	
5	点滴静注	時間：30分			バロレト点点滴静注バグ 0.75mg 50mL	1袋		○							
6	点滴静注	時間：30分	※最大1回2mg/body	●	ワレベン注 生理食塩液PL「フー」 50mL	1.4mg/m ² 1瓶		○							
7	点滴静注	時間：30分	積算値チェック	●	ドキシゲシ注 大塚生食注(100mL瓶)	50mg/m ² 1瓶		○							
8	点滴静注	時間：2時間		●	インドキサシ注 大塚生食注(250mL袋)	750mg/m ² 1袋		○							
	内服	時間：_____			加ナール ホラミン	500mg/day 2mg/day	○					○		○	
	内服	時間：_____			プレドニ	100mg/day		○	...	○					