

化学療法レジメン

レジメン名 【消】GEM+nab-PTX

レジメンの概要 転移性膀胱癌

診療科名 消化器 投与量設定 アブラキサン(パクリタキセル:アルブミン懸濁型) 125mg/m²(day1,8,15)、ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8,15)

管理コード 100130 インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8	...	Day 15				
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○		○				
2	点滴静注	時間 : 15分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○		○		○				
					グラセトリン点滴静注パツグ 1mg/50mL	1袋									
3	点滴静注	時間 : 30分	調製濃度5mg/mL アブラキサン溶解液のみ 点滴(生食残破棄) 生食の欄:total量を記載 フィルター不可	●	アブラキサン注	125mg/m ²	○		○		○				
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
4	点滴静注	時間 : 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○		○		○				
5	点滴静注	時間 : 30分		●	ゲムシタビン注	1000mg/m ²	○		○		○				
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									