

化学療法レジメン

レジメン名 【血】カルフィルゾミブ+DEX(2-9クール目)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

投与量設定(点滴) カイ°ロリス(カルフィルゾミブ) 70mg/m²(day1,8,15)

診療科名 血液 投与量設定(内服) レタデックス(デキサメタゾン) 40mg/body(day1,8,15,22)

管理コード 200028 インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8	...	Day 15	...	Day 22		
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★レタデックス内服 (カイ°ロリス投与1時間前までに)★		ブドウ糖液5%(100mL)	1瓶	○		○		○				
2	点滴静注	時間 : 30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:2mg/mL 必要量を抜き取り希釈 全量100mLに調製	●	カイ°ロリス注	70mg/m ²	○		○		○				
					注射用水(100mL)	1瓶									
					ブドウ糖液5% (希釈用)	1瓶									
	内服	時間 : _____			レタデックス	40mg/body	○		○		○		○		

カイプロリス
体表面積上限 : 2.2m²