

化学療法レジメン

レジメン名【乳】ペムプロリズマブ+GEM+CBDCA

レジメンの概要PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

診療科名乳腺

投与量設定キイトルダ(ハムプロリズマブ) 200mg/body(day1)、ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8)、カルボプラチン AUC=2、投与量=AUC×(25+GFR) (day1,8)

管理コード150210

インターバル日数21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8							
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 ★アプレミクタ内服(3日間連投) 1日目 : カルボプラチン投与1〜1.5時間前 2日目以降 : 午前中)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注	時間 : 30分		●	キイトルダ注 生理食塩液PL「フー」 50mL	200mg/body 1瓶	○								
3	点滴静注	時間 : 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○								
4	点滴静注	時間 : 15分			デキサト注射液6.6mg グラセトリ点静注バグ 1mg/50mL	1瓶 1袋	○	○							
5	点滴静注	時間 : 30分		●	ゲムシタビン注 大塚生食注(100mL瓶)	1000mg/m ² 1瓶	○	○							
6	点滴静注	時間 : 1時間		●	カルボプラチン注 大塚糖液5%(250mLリフトパック)	AUC=2 1袋	○	○							