

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】デュルバルマブ+GEM+CBDCA

上限：4クール

レジメンの概要 非小細胞肺癌における術前補助療法

診療科名 呼吸器 投与量設定 イミフィンジ(デュルバルマブ) 1500mg/body(day1)、ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8)、カルボプラチン AUC=3~5,投与量=AUC×(25+GFR) (day1)

管理コード 250242 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8								
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○								
2	点滴静注	時間： 1時間	フィルターライン使用	●	イミフィンジ 注 大塚生食注(250mL袋)	1500mg/body 1袋	○		イミフィンジ(デュルバルマブ)： 体重30kg以下には未適応							
3	点滴静注	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○									
4	点滴静注	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg アガリス点滴静注235m g パロセトロン点滴静注パック0.75mg 50mL	1瓶 1瓶 1袋	○									
5	点滴静注	時間： 15分			デキサト注射液6.6mg 生理食塩液PL「フー」 50mL	0.5瓶 1瓶		○								
6	点滴静注	時間： 30分		●	ゲムシタビン注 大塚生食注(100mL瓶)	1000mg/m ² 1瓶	○	○								
7	点滴静注	時間： 1時間		●	カルボプラチン注 大塚糖液5%(250mLソフトパック)	AUC=3~5 1袋	○									