

化学療法レジメン

レジメン名 【乳】サシズマブ ゴビテカン

レジメンの概要 化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌 ※体重80kg以上は未適応。

投与量設定(点滴) トロデルビ (サシズマブ ゴビテカン) 10mg/kg(day1,8)

診療科名 乳腺 投与量設定(内服) カナール(アトアミノフィン) 500mg(day1,8)

管理コード 150140 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8							
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カナール内服 (トロデルビ投与30分前までに)★口		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注	時間 : 30分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○	○							
					アホリス点滴静注235m g	1瓶									
					ファモジン注射用20mg	1管									
					ホﾟラミン注5mg	2管									
					バﾟロ/セトロン点滴静注バﾟッグ0.75mg 50mL	1袋									
3	点滴静注	時間 : 1時間	※初回は3時間 点滴バﾟッグを遮光 ★投与量が277.5mg以下の場合 生食100mLを廃棄して 全量150mLに調製★	●	トロデルビ	10mg/kg	○	○							
					生理食塩液 (希釈用)	1瓶									

地方独立行政法人 新小山市市民病院

トロデルビ(サシズマブ ゴビテカン) :
濃度が1.1～3.4mg/mLとなるように生理食塩液に希釈する。

※生食250mLで溶解し、同生食に希釈する場合、投与量の範囲は277.5mg～800mgとなる。
投与量が277.5mg以下となる場合は生食100mLを廃棄して全量150mLに調製。
投与量が800mg以上（体重が80kg以上）となる場合は未適応。