

化学療法レジメン

レジメン名 【消】ベバシズマブ+SOX

レジメンの概要 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌、結腸癌における術後補助化学療法

投与量設定(点滴) ベバシズマブ 7.5mg/kg(day1)、オキサリプラチン 130mg/m²(day1)

診療科名 消化器 投与量設定(内服) ティーエスワン(テガフル・ギメシル・オキサリルK) 80-120mg/day1日2回(day1-14) ※ティーエスワン：通常、day1夕～day15朝

管理コード 100035 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 14						
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間： 30分	全量100mLに調製 初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	ベバシズマブBS注 生理食塩液（希釈用）	7.5mg/kg 1袋	○								
3	点滴静注	時間： 15分			デキサト注射液6.6mg グラセトリン点滴静注バッグ 1mg/50mL	1瓶 1袋	○								
4	点滴静注	時間： 2時間	全量500mLに調製	●	オキサリプラチン注 ブドウ糖液5%（希釈用）	130mg/m ² 1袋	○								
	内服	時間： _____		●	ティーエスワン	80-120mg/day	○	...	○						

地方独立行政法人 新小山市民病院

【ティーエスワン】

C法：通常、成人には初回投与量（1回量）を体表面積に合わせて下表の基準量とし、朝食後及び夕食後の1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。
これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回