

化学療法レジメン

レジメン名【消】SOX(130mg/m<sup>2</sup>)

レジメンの概要治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌、結腸癌における術後補助化学療法、胃癌

投与量設定(点滴)オキサリプラチン 130mg/m<sup>2</sup>(day1)

診療科名消化器

投与量設定(内服)ティーエスワン(テガフル・ギメシル・オラシルK) 80-120mg/day1日2回(day1-14) ※ティーエスワン：通常、day1夕～day15朝

管理コード100031

インターバル日数21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間      | 用法・その他             | 癌 | 薬品名称                   | 用量/単位                | Day 1 | ... | Day 14 |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|-----------|--------------------|---|------------------------|----------------------|-------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| 1  | 点滴静注    | 時間： _____ | ルートkeep用<br>フラッシュ用 |   | 大塚生食注(100mL瓶)          | 1瓶                   | ○     |     |        |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 点滴静注    | 時間： 15分   |                    |   | デキサト注射液6.6mg           | 1瓶                   | ○     |     |        |  |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                    |   | グレースロン点滴静注バッグ 1mg/50mL | 1袋                   |       |     |        |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 点滴静注    | 時間： 2時間   | 全量500mLに調製         | ● | オキサリプラチン注              | 130mg/m <sup>2</sup> | ○     |     |        |  |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                    |   | ブドウ糖液5%（希釈用）           | 1袋                   |       |     |        |  |  |  |  |  |  |
|    | 内服      | 時間： _____ |                    | ● | ティーエスワン                | 80-120mg/day         | ○     | ... | ○      |  |  |  |  |  |  |

地方独立行政法人 新小山市民病院

【ティーエスワン】

C法：通常、成人には初回投与量（1回量）を体表面積に合わせて下表の基準量とし、朝食後及び夕食後の1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。  
これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

| 体表面積                                      | 初回基準量<br>(テガフル相当量) |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 1.25m <sup>2</sup> 未満                     | 40mg/回             |
| 1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満 | 50mg/回             |
| 1.5m <sup>2</sup> 以上                      | 60mg/回             |