

化学療法レジメン

レジメン名 【消】SOX(100mg/m²)

レジメンの概要 胃癌

診療科名 消化器

管理コード 100080

投与量設定(点滴) オキサリプラチン 100mg/m²(day1)

投与量設定(内服) ティーエスワン(テガフル・ギメラシル・オラシルK) 80-120mg/day1日2回(day1-14) ※ティーエスワン：通常、day1夕～day15朝

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 14						
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間：15分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○								
					グラセトン点滴静注バッグ1mg/50mL	1袋									
3	点滴静注	時間：2時間	全量500mLに調製	●	オキサリプラチン注(全量500mL用)	100mg/m ²	○								
					ブドウ糖液5% (希釈用)	1袋									
	内服	時間：_____		●	ティーエスワン	80-120mg/day	○	...	○						

地方独立行政法人 新小山市市民病院

【ティーエスワン】

C法：通常、成人には初回投与量（1回量）を体表面積に合わせて下表の基準量とし、朝食後及び夕食後の1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。
これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回