

化学療法レジメン

レジメン名【血】エプコリタマブ(4-9クール目)

レジメンの概要再発又は難治性の大細胞型B細胞リンパ腫(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫,高悪性度B細胞リンパ腫,原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫),再発又は難治性の濾胞性リンパ腫

投与量設定（注射）I7°キリ(I7°コリタマブ)48mg/body(day1,15)
※前回投与時にGrade2又は3のサイトカイン放出症候群が現れた場合のみ デキサト(デキサメタゾン) 16.5mg/body(day1-4,15-18)

診療科名血液

投与量設定（内服）加ナール(アトアミノフィン) 650-1000mg(day1,15)、ホ°ラミン(d-クルフェニラミン塩)2mg/day(day1,15)

管理コード200172

インターバル日数28（Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2-4	...	Day 15	Day 16-18				
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★加ナール,ホ°ラミン内服 (I7°キリ投与30-120分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○		○	○				
2	点滴静注	時間：15分			デキサト注射液6.6mg 生理食塩液PL「フソ」50mL	2.5瓶 1瓶	○	○		○	○				
3	点滴静注	時間：30分			大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○			○					
4	皮下注射	時間：_____	★加ナール,ホ°ラミン内服 (I7°キリ投与30-120分前までに)★	●	I7°キリ注	48mg/body	○			○					
	内服	時間：_____			加ナール ホ°ラミン	650-1000mg/day 2mg/day	○			○					

地方独立行政法人 新小山市民病院

前回投与時にGrade2又は3のサイトカイン放出症候群が
現れなかった場合はRp1-3は削除、Rp4のみ投与する。
※ホ°ラミン、加ナールは毎回投与する。