

化学療法レジメン

レジメン名 【血】ブレンツキシマブ ベドチン

上限：16クール

レジメンの概要 再発又は難治性のCD30陽性のホジキンリンパ腫及び末梢性T細胞リンパ腫

投与量設定(点滴) アトセトリス(ブレンツキシマブ ベドチン) 1.8mg/kg(day1)

診療科名 血液 投与量設定(内服) カナール(アセアミノフィン) 500mg/day(day1)、ホﾟラミン(d-カルルエリミンレイン酸塩) 2mg/day(day1)

管理コード 200116 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カナール、ホﾟラミン内服 (アトセトリス投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1袋	○									
2	点滴静注	時間：30分			グラセトリ点滴静注バッグ 1mg/50mL	1袋	○									
3	点滴静注	時間：30分	1Vにつき注射用水10.5mLで溶解 注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:5mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	アトセトリス注 注射用水(100mL) 大塚生食注(100mL瓶)	1.8mg/ k g 1瓶 1瓶	○									
	内服	時間：_____			カナール ホﾟラミン	500mg/day 2mg/day	○									