

化学療法レジメン

レジメン名 【消】nal-IRI+5-FU+I-LV

レジメンの概要 がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な膵癌

診療科名 消化器

投与量設定 ナビイト(リリテカ リポソーム製剤) 70、50mg/m²(day1)、レボリナト 200mg/m²(day1)、フルオウラシル 2400mg/m²(46hr)(day1-2)

管理コード 100036

インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	CVポート メイン	時間： _____	埋込式ルート 穿針時用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	CVポート メイン	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○									
					アホリス点滴静注235m g	1瓶										
					パロセトロン点滴静注パグ 0.75mg 50mL	1袋										
3	CVポート メイン	時間： 1時間30分	フィルター不可 レボリナトと同時投与	●	ナビイト注	70,50mg/m ²	○	UGT1A1*6若しくはUGT1A1*28のホモ接合体を有する患者、又はUGT1A1*6及びUGT1A1*28のヘテロ接合体を有する患者では、1回50mg/m ² で開始する。								
4	CVポート 側管	時間： 2時間	ナビイトと同時投与		レボリナト注	200mg/m ²	○									
					パドゥウ糖液5%(250mL)	1袋										
5	CVポート メイン	時間： 46時間	携帯型デスポ注入器 全量100mLに調製	●	フルオウラシル	2400mg/m ²	○									
					生理食塩液（希釈用）	1瓶										