

化学療法レジメン

レジメン名 【血】MPV(2,4,(6)クール目)

レジメンの概要 中枢神経系原発悪性リンパ腫

投与量設定 わコビン(ビンクリスチン) 1.4mg/m²(day1)、マイトセート(マイトリセート) 3500mg/m²(day1)

診療科名 血液 72時間前からST合剤中止,ループ利尿薬・NSAIDsはMTX感度以下まで併用禁忌 胸腹水がある症例は投与注意,CREによる用量調節は必要無い

管理コード 200131 インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 0	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5			
1	点滴静注 末梢側管	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶		○							
2	点滴静注 末梢メイン	時間 : 8時間			メイロ静注7% 大塚生食注(1000mLソフトパック)	2管 1袋		○ 9:00							
3	点滴静注 末梢側管	時間 : 30分			パロセチド点滴静注パケツ 0.75mg 50mL アロプリ点点滴静注235m g	1袋 1瓶		○ 10:00							
4	点滴静注 末梢側管	時間 : 30分	※最大1回2mg/body	● わコビン注 生理食塩液PL「フー」 50mL	1.4mg/m ² 1瓶			○ 10:30							
5	点滴静注 末梢側管	時間 : 3時間	全量500mLに調製	● マイトセート注 生理食塩液 (希釈用)	3500mg/m ² 1袋			○ 11:00							
6	側管静注	時間 : _____	マイトセートの血中濃度に応じて 増量の可能性有り 医師指示に従うこと	ロコルリン注3mg	5管					○ 11:00 5管固定	○ 11:00	○ 11:00			
7	側管静注	時間 : _____	生食10mLで溶解し5mL採取 シリンジで払い出し	ダイモック注 大塚生食注(20mL)	0.5瓶 0.25管			○ 15:00							
8	点滴静注 末梢メイン	時間 : 8時間		メイロ静注7% 大塚生食注(1000mLソフトパック)	2管 1袋			○ 17:00							
9	側管静注	時間 : _____	マイトセートの血中濃度に応じて 増量の可能性有り 医師指示に従うこと	ロコルリン注3mg	5管					○ 17:00	○ 17:00				
10	点滴静注	時間 : 12時間		メイロ静注7% 大塚生食注(1000mLソフトパック)	2管 1袋		○ 21:00								
11	側管静注	時間 : _____	生食10mLで溶解し5mL採取 シリンジで払い出し	ダイモック注 大塚生食注(20mL)	0.5瓶 0.25管		○ 21:00	○ 21:00							
12	側管静注	時間 : _____	マイトセート投与開始36時間後より開始	ロコルリン注3mg	17管				○ 23:00						
13	側管静注	時間 : _____	マイトセートの血中濃度に応じて 増量の可能性有り 医師指示に従うこと	ロコルリン注3mg	5管					○ 23:00	○ 23:00				
14	点滴静注 末梢メイン	時間 : 8時間		メイロ静注7% 大塚生食注(1000mLソフトパック)	2管 1袋			○ 1:00							
15	側管静注	時間 : _____	生食10mLで溶解し5mL採取 シリンジで払い出し	ダイモック注 大塚生食注(20mL)	0.5瓶 0.25管			○ 3:00							
16	側管静注	時間 : _____	マイトセートの血中濃度に応じて 増量の可能性有り 医師指示に従うこと	ロコルリン注3mg	5管					○ 5:00 5管固定	○ 5:00	○ 5:00			