

化学療法レジメン

レジメン名【血】《皮下》AZA

レジメンの概要 骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病

投与量設定(注射) アザシジン 75mg/m<sup>2</sup>(day1-7)

診療科名 血液 投与量設定(内服) カイトリル(グラネセトン) 2mg/day(day1-7)

管理コード 200065 インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) ※インターバル日数は原則28日ですが休日等を考慮して21日で登録しております。

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間     | 用法・その他           | 癌 | 薬品名称             | 用量/単位               | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |  |  |
|----|---------|----------|------------------|---|------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 1  | 皮下注射    | 時間：_____ | 注射用水の欄:total量を記載 | ● | アザシジン注(皮下用)      | 75mg/m <sup>2</sup> | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |  |  |
|    |         |          | 溶解後濃度:25mg/mL    |   | 注射用水PL「アザ」(20mL) | 1管                  |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|    |         |          | 必要量を抜き取り希釈       |   |                  |                     |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|    |         |          | 調製から1時間以内に投与     |   |                  |                     |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|    | 内服      | 時間：_____ |                  |   | カイトリル            | 2mg/day             | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |  |  |
|    |         |          |                  |   |                  |                     |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|    |         |          |                  |   |                  |                     |       |       |       |       |       |       |       |  |  |

地方独立行政法人 新小山市民病院