

化学療法レジメン

レジメン名【乳】ペムプロリズマブ+AC

上限：4クール

レジメンの概要ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前薬物療法

診療科名乳腺

投与量設定キイトルダ(ヘムプロリズマブ) 200mg/body(day1)、ドキシセチン 60mg/m²(day1)、エンドキサ(シカルファミド) 600mg/m²(day1)

管理コード150230

インターバル日数21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間：30分	フィルターライン使用	●	キイトルダ注	200mg/body	○									
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶										
3	点滴静注	時間：10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○									
4	点滴静注	時間：30分			デキサト注射液6.6mg	1.5瓶	○									
					アロカリス点滴静注235m g	1瓶										
					パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋										
5	点滴静注	時間：10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」50mL	1瓶	○									
6	点滴静注	時間：10分	全開で	●	ドキシセチン注	60mg/m ²	○									
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶										
7	点滴静注	時間：10分	全開で	●	エンドキサ注	600mg/m ²	○									
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶										

4クール施行後
ペムプロリズマブ(150240)へ移行

積算値チェック