

化学療法レジメン

レジメン名【消】セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビニメチニブ(2クール目以降)

レジメンの概要がん化学療法後に増悪したBRAF 遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

投与量設定(点滴)ア-ビ`タックス(セツキシマブ`) 250mg/m²(day1)

診療科名消化器

投与量設定(内服)ヒ`ラフト` (インコラフェニブ` )300mg/day1日1回(day1-7)、メト` (ビニメチニブ`)90mg/day1日2回(day1-7)

管理コード100067

インターバル日数7 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 7						
1	点滴静注	時間： 10分	穿針時用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○								
2	点滴静注	時間： 30分			デ`キート注射液6.6mg	1瓶	○								
					ホ`ラミン注5mg	2管									
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
3	点滴静注	時間： 1時間	全量250mLに調製	●	ア-ビ`タックス注	250mg/m ²	○								
					生理食塩液（希釈用）	1瓶									
4	点滴静注	時間： 1時間			大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
	内服	時間： _____		●	ヒ`ラフト`	300mg/day	○	...	○						
	内服	時間： _____		●	メト`	90mg/day	○	...	○						