

化学療法レジメン

レジメン名 【消】ソルバツキシマブ+CapeOX(1クール目)

レジメンの概要 CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌

投与量設定(点滴) ビ`ロイ(ソルバツキシマブ) 800mg/m²(day1)、オキサリプラチン 130mg/m²(day1)

投与量設定(内服) ゼ`ロ-ダ(カ`シタベン) 2400-4200mg/day1日2回(day1-14) ※ゼ`ロ-ダ：通常、day1夕～day15朝、

ジ`プロレサ(オ`ザビ`ン) 5mg/day1日1回夕食後(day0-5)

診療科名 消化器

管理コード 100032

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 0	Day 1	...	Day 5	...	Day 14			
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶		○							
2	点滴静注	時間： 30分			デ`キート注射液6.6mg	1.5瓶		○							
					ア`カリ点注235mg	1瓶									
					ホ`ラミン注5mg	2管									
					ハ`ロイ点注0.75mg 50mL	1袋									
3	点滴静注	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶		○							
4	点滴静注	時間： _____	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:20mg/mL 必要量を抜き取り希釈 2.0mg/mLに希釈調製して使用 0-30分：75mL/h 30-60分：150mL/h 60分以降：200mL/h	● ビ`ロイ注	800mg/m ²			○							
					注射用水(100mL)	1瓶									
					生理食塩液（希釈用）	mL									
5	点滴静注	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶		○							
6	点滴静注	時間： 2時間	全量500mLに調製	● オキサリプラチン注	130mg/m ²			○							
					ブ`ドウ糖液5%（希釈用）	1袋									
	内服	時間： _____		● ゼ`ロ-ダ	2400-4200mg/day			○	...	...	...	○			
	内服	時間： _____			ジ`プロレサ	5mg/day	○	...	...	○					

【ゼ`ロ-ダ】

地方独立行政法人 新小山市民病院

C法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。

これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	1回用量
1.36m ² 未満	1,200mg
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1,500mg
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1,800mg
1.96m ² 以上	2,100mg