

化学療法レジメン

レジメン名 **【消】セツキシマブ+エンコラフェニブ+FOLFOX6**

レジメンの概要 BRAF 遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

投与量設定(点滴) アービタックス(セツキシマブ) 500mg/m²(day1)、レボレチナート 200mg/m²(day1)、オキサリプラチン 85mg/m²(day1)、フルオウラシル 400mg/m²(bolus)(day1)、2400mg/m²(46hr)(day1-2)

診療科名 消化器

投与量設定(内服) ビラフトビ (エンコラフェニブ)300mg/day1日1回(day1-14)

管理コード 100059

インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 14							
1	CVポート メイン	時間: _____	埋込式ルート 穿針時用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	CVポート メイン	時間: 30分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○									
					ホラミン注5mg	2管										
					グラセト点静注パック 1mg/50mL	1袋										
3	CVポート メイン	時間: 2時間	全量500mLに調製	●	アービタックス注	500mg/m ²	○									
					生理食塩液 (希釈用)	1瓶										
4	CVポート メイン	時間: 1時間			大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
5	CVポート 側管	時間: 2時間	オキサリプラチンと同時投与		レボレチナート注	200mg/m ²	○									
					大塚糖液5%(250mLシフトパック)	1袋										
6	CVポート メイン	時間: 2時間	レボレチナートと同時投与 全量250mLに調製	●	オキサリプラチン注	85mg/m ²	○									
					ブドウ糖液5% (希釈用)	1袋										
7	CVポート メイン	時間: 10分	全開で	●	フルオウラシル注	400mg/m ²	○									
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶										
8	CVポート メイン	時間: 46時間	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	フルオウラシル注	2400mg/m ²	○									
					生理食塩液 (希釈用)	1瓶										
	内服	時間: _____		●	ビラフトビ	300mg/day	○	...	○							