

# 化学療法レジメン

レジメン名 【血】ABVD

上限：6クール

レジメンの概要 ホジキンリンパ腫

診療科名 血液

投与量設定 ドキルビジン 25mg/m<sup>2</sup>(day1,15)、イグザール(ビソアミン) 6mg/m<sup>2</sup>(day1,15)、アレオ(アモロイシン) 10mg/m<sup>2</sup>(day1,15)、ダカルバジン 375mg/m<sup>2</sup>(day1,15)

管理コード 200026

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間     | 用法・その他                                                           | 癌 | 薬品名称                      | 用量/単位                | Day 1 | ... | Day 15 |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|----------|------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|-------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| 1  | 点滴静注    | 時間：_____ | ルートkeep用<br>フラッシュ用                                               |   | 大塚生食注(100mL瓶)             | 1瓶                   | ○     |     | ○      |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 点滴静注    | 時間：30分   |                                                                  |   | リル・コテフ注射用100mg            | 1瓶                   | ○     |     | ○      |  |  |  |  |  |  |
|    |         |          |                                                                  |   | パロノセトロン点滴静注パック0.75mg 50mL | 1袋                   |       |     |        |  |  |  |  |  |  |
|    |         |          |                                                                  |   | アロカリス点滴静注235mg            | 1瓶                   |       |     |        |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 点滴静注    | 時間：10分   | フラッシュ用                                                           |   | 生理食塩液PL「フー」50mL           | 1瓶                   | ○     |     | ○      |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 点滴静注    | 時間：30分   | 積算値チェック                                                          | ● | ドキルビジン注                   | 25mg/m <sup>2</sup>  | ○     |     | ○      |  |  |  |  |  |  |
|    |         |          |                                                                  |   | 生理食塩液PL「フー」50mL           | 1瓶                   |       |     |        |  |  |  |  |  |  |
| 5  | 点滴静注    | 時間：15分   | ※最大1回10mg/body                                                   | ● | イグザール注                    | 6mg/m <sup>2</sup>   | ○     |     | ○      |  |  |  |  |  |  |
|    |         |          |                                                                  |   | 生理食塩液PL「フー」50mL           | 1瓶                   |       |     |        |  |  |  |  |  |  |
| 6  | 点滴静注    | 時間：30分   | ※最大1回15mg/body                                                   | ● | アレオ注                      | 10mg/m <sup>2</sup>  | ○     |     | ○      |  |  |  |  |  |  |
|    |         |          | 積算値チェック                                                          |   | 大塚生食注(100mL瓶)             | 1瓶                   |       |     |        |  |  |  |  |  |  |
| 7  | 点滴静注    | 時間：2時間   | 注射用水の欄:total量を記載<br>溶解後濃度:10mg/mL<br>必要量を抜き取り希釈<br>点滴経路全般を遮光して投与 | ● | ダカルバジン注                   | 375mg/m <sup>2</sup> | ○     |     | ○      |  |  |  |  |  |  |
|    |         |          |                                                                  |   | 注射用水(100mL)               | 1瓶                   |       |     |        |  |  |  |  |  |  |
|    |         |          |                                                                  |   | 大塚生食注(250mL袋)             | 1袋                   |       |     |        |  |  |  |  |  |  |

地方独立行政法人 新小山市民病院