

化学療法レジメン

レジメン名 【消】ペムプロリズマブ+トラスツズマブ+FP(1クール)

レジメンの概要 治癒切除不能な進行・再発の胃癌（HER2陽性、CPS陽性）

診療科名 消化器 投与量設定 キトルーダ®(ペムプロリズマブ) 200mg/body(day1)、トラスツズマブ® 8mg/kg(day1)、シスプラチン 80mg/m²(day1)、フルオウラシル 800mg/m²(day1-5)

管理コード 100244 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5				
1	点滴静注 末梢メイン	時間：1時間30分			硫酸Mg補正液1mEq/mL	1管	○ 7:00								
					大塚生食注(500mL袋)	1袋									
2	点滴静注 末梢メイン	時間：1時間	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(250mL袋)	1袋	○ 8:30								
3	点滴静注 末梢メイン	時間：30分	フィルターライン使用	●	キトルーダ®注	200mg/body	○ 9:30								
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
4	点滴静注 末梢メイン	時間：	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○ 10:00								
5	点滴静注 末梢メイン	時間：1時間30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブ® BS注	8mg/kg	○ 10:00								
					注射用水(100mL)	1瓶									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
6	点滴静注 末梢メイン	時間：30分			デキサート注射液6.6mg	1.5瓶	○ 11:30								
					アクリス点滴静注235mg	1瓶									
					パロリトロン点滴静注パッガ®0.75mg 50mL	1袋									
7	点滴静注 末梢メイン	時間：2時間			マンニトールS注射液300mL	1袋	○ 12:00								
8	点滴静注 末梢側管	時間：30分			デキサート注射液6.6mg	1瓶		○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00				
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
9	点滴静注 末梢メイン	時間：2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シスプラチン注	80mg/m ²	○ 14:00	積算値チェック							
					生理食塩液（希釈用）	1袋									
10	点滴静注 末梢側管	時間：3時間			リユーゲン注 500mL	1袋	○ 16:00	○ 13:30	○ 13:30	○ 13:30	○ 13:30				
11	点滴静注 末梢メイン	時間：24時間		●	フルオウラシル注	800mg/m ²	○ 16:00	○ 16:00	○ 16:00	○ 16:00	○ 16:00				
					大塚生食注 1L	1袋									
12	点滴静注 末梢側管	時間：3時間			フィジール140輸液 500ml	1袋	○ 19:00	○ 16:30	○ 16:30	○ 16:30	○ 16:30				
13	点滴静注 末梢側管	時間：3時間			リデム3A輸液(500mL)	1袋	○ 22:00	○ 19:30	○ 19:30	○ 19:30	○ 19:30				