

化学療法レジメン

レジメン名【消】パニツムマブ+FOLFOX6

レジメンの概要結腸、直腸癌

診療科名消化器

投与量設定

管理コード100008

インターバル日数14（Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

パニツムマブ(パニツムマブ) 6mg/kg(day1)、レボレチン 200mg/m²(day1)、オキサリプラチン 85mg/m²(day1)、フルオウラシル 400mg/m²(bolus)(day1)、2400mg/m²(46hr)(day1-2)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	CVポート メイン	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	CVポート メイン	時間： 1時間	全量100mLに調製 フィルターライン使用	●	パニツムマブ注	6mg/kg	○									
					生理食塩液（希釈用）	1瓶										
3	CVポート メイン	時間： 15分			デキサメタゾン注射液6.6mg	1瓶	○									
					グラセチン点滴静注パッキング 1mg/50mL	1袋										
4	CVポート 側管	時間： 2時間	オキサリプラチンと同時投与		レボレチン注	200mg/m ²	○									
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋										
5	CVポート メイン	時間： 2時間	レボレチンと同時投与 全量250mLに調製	●	オキサリプラチン注	85mg/m ²	○									
					ブドウ糖液5%（希釈用）	1袋										
6	CVポート メイン	時間： 10分	全開で	●	フルオウラシル注	400mg/m ²	○									
					生理食塩液PL「フソ」 50mL	1瓶										
7	CVポート メイン	時間： 46時間	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	フルオウラシル注	2400mg/m ²	○									
					生理食塩液（希釈用）	1瓶										