

化学療法レジメン

レジメン名 【泌】M-VAC

レジメンの概要 進行期膀胱癌・腎盂癌・尿管癌

投与量設定(点滴) ヌトドセ-ト(ヌトドセ-ト) 30mg/mi(day1,15,22)、イカ-ル(ヒ-ツラチン) 3mg/mi(day2,15,22)、ヒ-ルヒ-ン(ヒ-ラヒ-ン) 30mg/mi(day2)、シラチン 70mg/mi(day2)

診療科名 泌尿器

投与量設定(内服) ア-レ-タ 125mg(day1) 80mg(day2,3)

管理コード 300015

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	...	Day 15	...	Day 22
1	点滴静注 末梢メイン	時間： 右記参照			ヌトドセ-ト注10mg	1管	○	○	○	○	○		○		○
					ソリ-ゲンF注 500mL	1瓶	9:00 (6時間)	6:00 (4時間)	6:00 (4時間)	6:00 (7時間)	9:00 (6時間)		9:00 (5時間)		9:00 (5時間)
2	点滴静注 末梢側管	時間： 30分	★ア-レ-タ内服(3日間連投 1日目:シラチン投与1～1.5時間前 2日目以降:午前中)★		デ-サ-ト注射液6.6mg	1.5瓶		○							
					ヒ-ルヒ-ン点滴静注(ア-ラ) 0.75mg 50mL	1袋		9:00							
3	点滴静注 末梢側管	時間： 30分			デ-サ-ト注射液6.6mg	1瓶			○	○	○				
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶			9:00	9:00	9:00				
4	側管静注	時間： _____			ア-レ-タ注射液20mg	0.5管		○	○	○					
								9:30	9:30	9:30					
5	点滴静注 末梢側管	時間： 5分	全開で	●	ヌトドセ-ト注	30mg/mi	○						○		○
					生理食塩液PL「ア-」 50mL	1瓶	10:00						10:00		10:00
6	点滴静注 末梢側管	時間： 5分	全開で	●	イカ-ル注	3mg/mi		○					○		○
					生理食塩液PL「ア-」 50mL	1瓶		9:35					10:05		10:05
7	点滴静注 末梢側管	時間： 5分	全開で	●	ヒ-ルヒ-ン注	30mg/mi		○							
					注射用水(100mLア-ラシツクホ-トル)	0.5瓶		9:40	積算値チェック						
8	点滴静注 末梢側管	時間： 3時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シラチン注	70mg/mi		○							
					大塚生食注(500mL袋)	1袋		10:00	積算値チェック						
9	点滴静注 末梢メイン	時間： 右記参照			ソリ-Δ3A輸液(500mL)	1袋		○	○	○	○		○		○
								10:00 (6時間)	10:00 (4時間)	13:00 (7時間)	15:00 (6時間)		14:00 (5時間)		14:00 (5時間)
10	側管静注	時間： _____			ア-レ-タ注射液20mg	0.5管		○							
								13:00							
11	点滴静注 末梢メイン	時間： 右記参照			ヌトドセ-ト注10mg	1管		○	○	○					
					ラツケツG輸液(500mL袋)	1袋		16:00 (4時間)	14:00 (5時間)	20:00 (13時間)					
12	側管静注	時間： _____			ア-レ-タ注射液20mg	0.5管		○	○						
								19:00	19:00						
13	点滴静注 末梢メイン	時間： 右記参照			ソリ-Δ3A輸液(500mL)	1袋	○	○	○						
							15:00 (6時間)	20:00 (4時間)	19:00 (5時間)						
14	点滴静注 末梢メイン	時間： 右記参照			ソリ-ゲンF注 500mL	1瓶	○	○	○						
							21:00 (9時間)	0:00 (6時間)	0:00 (6時間)						
	内服	時間： _____			ア-レ-タ		○	○	○						
							125mg	80mg	80mg						