

化学療法レジメン

レジメン名 【血】ダラツムマブ+VMP(2-9クール目)

レジメンの概要 多発性骨髄腫

投与量設定(注射) ダラキ-0(ダラツムマブ, ホルヒアルニターゼ アルファ) 1瓶(day1,22)、ホルテゾミブ 1.3mg/m²(day1,8,22,29)

投与量設定(内服) メルファラン(アルケラン) 9mg/m²(day1-4)、フロレトニン(フロレトニン) 60mg/m²(day2-4)、レナデックス(デキサメタゾン) 20mg/day(day1,22)、

カロナール(アセトアミノフェン) 500mg/day(day1,22)、ホウラミン(d-グルフェニラミン塩酸塩) 2mg/day(day1,22)

診療科名 血液

管理コード 200042

インターバル日数 42 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	...	Day 4	...	Day 8	...	day 22	...	day 29
1	皮下注射	時間: _____	★レナデックス, カロナール, ホウラミン内服 (ダラキ-0投与 1 時間前までに)★ 臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に 本剤15mLを約3～5分かけて投与	●	ダラキ-0注	1瓶	○							○		
2	皮下注射	時間: _____	1Vにつき生食1.2mLで 溶解(残破棄) 生食の欄:total量を記載	●	ホルテゾミブ注 生食液NS 20mL	1.3mg/m ² 1管	○					○		○		○
	内服	時間: _____			レナデックス カロナール ホウラミン	20mg/day 500mg/day 2mg/day	○							○		
	内服	時間: _____		●	メルファラン	9mg/m ²	○	...	...	○						
	内服	時間: _____			フロレトニン	60mg/m ²		○	...	○						