

化学療法レジメン

レジメン名 【泌】カバジタキセル+PSL

レジメンの概要 前立腺癌

投与量設定(注射) ジェノバ(カバジタキセル) 25mg/m² (day1)、ジールスタ 3.6mg/回 皮下注(day2)

診療科名 泌尿器 投与量設定(内服) プレドニゾロン 10mg/day(連日)

管理コード 300003 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	...	Day 21					
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○								
					ファモチジン注射用20mg	1管									
					ホーラミン注5mg	2管									
					生理食塩液PL「フソ」 50mL	1瓶									
3	点滴静注	時間： 1時間	フィルターライン使用 添付溶解液あり(全量使用) 溶解後濃度:10mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	ジェノバ注	25mg/m ²	○								
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
	皮下注	時間： _____			ジールスタ	3.6mg/回		○							
	内服	時間： _____		●	プレドニゾロン	10mg/day	○	...	...	○					