

化学療法レジメン

レジメン名 【乳】トラスツズマブ+PTX(毎週)(1クール目)

レジメンの概要 乳癌（1クール4週間分） 導入時用

診療科名 乳腺 投与量設定 ハ°クリタセル 80mg/m²(day1,8,15,22)、トラスツズマブ 4mg/kg(day1) 2mg/kg(day8,15,22)

管理コード 150040 インターバル日数 28（Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22					
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○	○					
2	点滴静注	時間：15分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○	○	○	○					
					ファモチジン注射用20mg	1管									
					ホ°ラミン注5mg	2管									
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
3	点滴静注	時間：1時間	フィルターライン使用	●	ハ°クリタセル注	80mg/m ²	○	○	○	○					
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
4	点滴静注	時間：1時間30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブ BS注	4mg/kg	○								
					注射用水(100mL)	1瓶									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
5	点滴静注	時間：30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブ BS注	2mg/kg		○	○	○					
					注射用水(100mL)	1瓶									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									