

化学療法レジメン

レジメン名 【血】イサツキシマブ+DEX(1クール目)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

投与量設定(点滴) サークリサ(イサツキシマブ) 20mg/kg(day1,8,15,22)

投与量設定(内服) レデックス(デキサメタゾン) 20-40mg/day(day1,8,15,22)、カロナール(アセトアミノフェン) 500mg/day(day1,8,15,22)、

ホﾟラミン(d-グルタミン酸塩) 2mg/day(day1,8,15,22)

診療科名 血液

管理コード 200202

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8	...	Day 15	...	Day 21	Day 22	
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 ★レデックス、カロナール、ホﾟラミン内服 (サークリサ投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○		○			○	
2	点滴静注	時間 : <u>5時間</u>	全量500mLに調製 フィルターライン使用 0-60分 : 25mL/h 60分以降 : 30分ごとに25mL/hずつ増量可 ※最大150mL/hまで	●	サークリサ注 生理食塩液 (希釈用)	20mg/kg 1袋	○								
		時間 : <u>3時間8分</u>	0-30分 : 50mL/h 30-60分 : 100mL/h 60分以降 : 200mL/h						○						
		時間 : <u>2時間30分</u>	200mL/hで投与							○				○	
	内服	時間 : _____			レデックス	20-40mg/day	○		○		○			○	
	内服	時間 : _____			カロナール ホﾟラミン	500mg/day 2mg/day	○		○		○			○	

地方独立行政法人 新小山市民病院