

化学療法レジメン

レジメン名【消】ラムシルマブ+nab-PTX

レジメンの概要治癒切除不能な進行・再発の胃癌

診療科名消化器

投与量設定サイラムザ(ラムシルマブ)8mg/kg(day1,15)、アブラキサ(ハククリタセル:アルブミン懸濁型)100mg/m²(day1,8,15)

管理コード100146

インターバル日数28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8	...	Day 15				
1	点滴静注 末梢メイン	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 (day8はフィルター不可)		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○		○				
2	点滴静注 末梢メイン	時間 : 15分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○				○				
					ホラミン注5mg	2管									
					グラセトリン点滴静注バッグ 1mg/5	1袋									
3	点滴静注 末梢メイン	時間 : 15分			デキサト注射液6.6mg	1瓶			○						
					生理食塩液PL「フー」50mL	1瓶									
4	点滴静注 末梢メイン	時間 : 30分	全量250mLに調製 フィルターライン使用 ※初回は1時間	●	サイラムザ注	8mg/kg	○				○				
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
5	点滴静注 末梢メイン	時間 : _____	ルートフラッシュ		生理食塩液PL「フー」50mL	1瓶	○				○				
6	点滴静注 末梢側管	時間 : 30分	調製濃度5mg/mL アブラキサン溶解液のみ 点滴(生食残破棄) 生食の欄:total量を記載 フィルター不可	●	アブラキサ注	100mg/m ²	○		○		○				
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									