

化学療法レジメン

レジメン名【消】ベバシズマブ+TAS-102

レジメンの概要治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

投与量設定(点滴)ヘパシズマブ 5mg/kg(day1,15)

診療科名消化器投与量設定(内服)ロンサーフ(トリフルリジン・ヒドラル) 35mg/m²/回 1日2回(day1-5,8-12) ※ロンサーフ：通常、day1夕-day6朝,day8夕-day13朝

管理コード100037インターバル日数28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 5	...	Day8	...	Day 12	...	Day 15
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								○
2	点滴静注	時間： 30分	全量100mLに調製 初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	ヘパシズマブBS注 生理食塩液（希釈用）	5mg/kg 1瓶	○								○
	内服	時間： _____		●	ロンサーフ(トリフルリジン・ヒドラル)	35mg/m ² /回 1日2回	○	...	○		○	...	○		

地方独立行政法人 新小山市民病院

【ロンサーフ】

通常、成人には初回投与量（1回量）を体表面積に合わせて次の基準量とし（トリフルリジンとして約35mg/m2/回）、朝食後及び夕食後の1日2回、5日間連続経口投与したのち2日これを2回繰り返したのち14日間休薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積（m ² ）	初回基準量 （トリフルリジン相当量）
1.07未満	35mg/回（70mg/日）
1.07以上～1.23未満	40mg/回（80mg/日）
1.23以上～1.38未満	45mg/回（90mg/日）
1.38以上～1.53未満	50mg/回（100mg/日）
1.53以上～1.69未満	55mg/回（110mg/日）
1.69以上～1.84未満	60mg/回（120mg/日）
1.84以上～1.99未満	65mg/回（130mg/日）
1.99以上～2.15未満	70mg/回（140mg/日）
2.15以上	75mg/回（150mg/日）