

化学療法レジメン

レジメン名 【血】エプコリタマブ《3ステップ漸増》(1クール目)

レジメンの概要 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫(Grade1~3A)

投与量設定 (注射) I⁷キリ(I⁷コリタマブ)0.16mg/body(day1)0.8mg/body(day8)3mg/body(day15)48mg/body(day22)、

デキスト(デキストラン) 16.5mg/body(day1-4,8-11,15-18,22-25)

投与量設定 (内服) ガナール(アセトミノフェン) 650-1000mg(day1,8,15,22)、ホ⁷ラミン(d-グルクロン酸塩)2mg/day(day1,8,15,22)

※CRS軽減策としてエプキリ投与前24時間に降圧薬の中断を考慮する。(1クール目のみ)

診療科名 血液

管理コード 200174

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2-4	...	Day 8	Day 9-11	...	Day 15	Day 16-18	...	Day22	Day23-25
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★ガナール,ホ ⁷ ラミン内服 (I ⁷ キリ投与30-120分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○		○	○		○	○		○	○
2	点滴静注	時間 : 15分			デキスト注射液6.6mg	2.5瓶	○	○		○	○		○	○		○	○
					生理食塩液PL「フー」50mL	1瓶											
3	点滴静注	時間 : 30分			大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○			○			○			○	
4	皮下注射	時間 : _____	※調製手順①を参照	●	I ⁷ キリ注	0.16mg/body	○										
					生理食塩液	0.968mL											
5	皮下注射	時間 : _____	※調製手順②を参照	●	I ⁷ キリ注	0.8mg/body				○							
					生理食塩液	0.85mL											
6	皮下注射	時間 : _____		●	I ⁷ キリ注	3mg/body							○				
7	皮下注射	時間 : _____		●	I ⁷ キリ注	48mg/body										○	
	内服	時間 : _____			ガナール	650-1000mg/day	○			○			○			○	
					ホ ⁷ ラミン	2mg/day											

地方独立行政法人 新小山市民病院

※調整手順①
4mg/バイアルより0.8mLを生食4.2mLで希釈し0.8mg/mLの溶液とする
その溶液2.0mLを生食8.0mLで更に希釈し0.16mg/mLの溶液とする
そこから1.0mLを採液する

※調整手順②
4mg/バイアルより0.8mLを生食4.2mLで希釈し0.8mg/mLの溶液とする
そこから1.0mLを採液する

初回の48mg投与後48時間(通常Day22以降3日間)は
必ず入院管理とすること