

化学療法レジメン

レジメン名	【消】《点滴》トラスツズマブ+ペルツズマブ(1クール目)		
レジメンの概要	がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌		
診療科名	消化器	投与量設定	トラスツズマブ 8mg/kg(day1)、ハﾟｰｼﾞｴﾀ(ﾊﾟﾙツｽﾞﾏﾌﾞ) 840mg/body(day1)
管理コード	100157	インターバル日数	21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間 : 1時間30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブ BS注	8mg/kg	○								
					注射用水(100mL)	1瓶									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
3	点滴静注	時間 : 1時間		●	ハﾟｰｼﾞｴﾀ注	840mg/body	○								
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									