

化学療法レジメン

レジメン名 【乳】CMF

レジメンの概要 乳癌 (1クール4週 6クール施用)

投与量設定(点滴) ヌトレセ-ト(ヌトレセ-ト) 40mg/m²(day1,8)、フルオウラシル 600mg/m²(day1,8)

診療科名 乳腺 投与量設定(内服) インドキサン(シタキスファミド) 100mg/m²/day(day1-14)

管理コード 150010 インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8	...	Day 14				
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○						
2	点滴静注	時間 : 15分			デキサ-ト注射液6.6mg	1瓶	○		○						
					グラセ-ト点滴静注パ-ッヅ1mg/50mL	1袋									
3	点滴静注	時間 : 10分	全開で	●	ヌトレセ-ト注	40mg/m ²	○		○						
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
4	点滴静注	時間 : 10分	全開で	●	フルオウラシル注	600mg/m ²	○		○						
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
	内服	時間 : _____		●	インドキサン	100mg/m ² /day	○	...	...	...	○				