

化学療法レジメン

レジメン名 【血】リツキシマブ

レジメンの概要 悪性リンパ腫

投与量設定(点滴) リツキシマブ 375mg/m²(day1)

診療科名 血液 投与量設定(内服) カナル(アトアミノフェン) 500mg/day(day1)、ホ[®]ラミン(d-クルルフェニラミンレイン酸塩) 2mg/day(day1)

管理コード 200010 インターバル日数 7 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) 他レジメンと併用できるよう設定しています。

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カナル,ホ [®] ラミン内服 (リツキシマブ 投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	側管静注	時間 : _____			リル・コテフ注射用100mg	1瓶	○								
3	点滴静注	時間 : _____	初回:50mL/h開始, 30分毎に50mL/hずつ増量可 2クール目以降:100mL/h開始, 30分毎に100mL/hずつ増量可 ※最大400mL/hまで 10倍に希釈調製して使用	●	リツキシマブ [®] BS注 生理食塩液（希釈用）	375mg/m ² mL	○								
	内服	時間 : _____			カナル ホ [®] ラミン	500mg/day 2mg/day	○								